

# Forslag fra PLO og DSAM

## Almen praksis under corona-epidemien - hvilke patienter kan almen praksis passe og hvordan?

Opdateret d. 16. marts

- **Generelt**

- Befolkningens modstandskraft mod corona styrkes ved, at patienter med kroniske sygdomme er velregulerede i deres behandling, og at vaccinationsprogrammerne overholdes. Disse ting må ikke fortrænges.
- I størst muligt omfang, og hvor det er fagligt forsvarligt, bør video- / telefonkonsultation erstatte konsultationer med fysisk fremmøde.

- **Patienter med luftvejsinfektioner**

- De må IKKE møde op i almen praksis. Derfor vigtigt, at der ikke er åben konsultation eller mulighed for elektronisk tidsbestilling.
- Skilte på alle indgangsdøre til praksis.
- Sygebesøg kan gennemføres, hvis lægen benytter de nødvendige værnemidler.

- **Patienter i risikogruppen jf. Sundhedsstyrelsens definition<sup>1</sup> og uden luftvejsinfektioner**

- Akutte/subakutte fremmødekonsultationer kan gennemføres efter lægens skøn
- Patienter i risikogrupperne bør dog som hovedregel ikke ses i konsultation, medmindre der er særlige forhold, som gør, at det er vigtigt at få vurderet et helbredsproblem, som ved udsættelse kan true deres helbred. Det kan fx være kontrol af INR, nyrefunktion, psykofarmaka, tegn på kræft, børn med vital indikation for vaccination til tiden, opfølgning på patienter med kronisk sygdom i ikke-stabil fase, m.fl.

---

<sup>1</sup> <https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ>

- Fysiske konsultationer med patienter i risikogruppen skal være tidsmæssigt eller fysisk adskilt fra andre patienter. Lægen bør overveje alternativt at køre sygebesøg til disse patienter.
- **Patienter uden for risikogruppen og uden luftvejsinfektioner**
  - Almen praksis bør, hvis kapaciteten tillader det, fortsætte med almindelige akutte/subakutte konsultationer, opfølgning af patienters kroniske sygdomme og forebyggelsesarbejdet. Video- / telefonkonsultation bør dog altid overvejes som første valg.
  - Fremmødeattester kan udføres ved brug af nyligt indhentede oplysninger/resultater på patienter, evt. suppleret med telefonisk eller videokonsultation med patienten.
- **Sundhedspersonerne**
  - Læger og personale med de mindste symptomer på luftvejsinfektion bør ikke møde op til tjeneste og bør sendes hjem øjeblikkeligt, hvis de viser tegn på luftvejsinfektion. Når symptomerne ophører, kan personen møde igen. Men hvis sygdommen kom efter kontakt med verificeret COVID 19-smittet, anbefales at man bliver hjemme i 48 timer, efter symptomerne er gået væk.
- **Rengøring**
  - Ekstraordinær rengøring i praksis med hyppigere rengøring og desinfektion af overflader med håndkontakt (dørhåndtag, borde, stole mm)
- **Venteværelser**
  - Indrettes med minimum 1 meters afstand mellem stolene, og der bør være sprit tilgængelig for patienterne i rummet. Driften bør planlægges, så patienterne opholder sig så kort tid som muligt i venteværelset.