

Svangerskabsafbrydelse

3820	3. konsultation medicinsk abort
Ny/eksisterende	Eksisterende (sammenlægning af ydelserne 3813/3814 (Svangerskabsafbrydelse))
Målgruppe/indikation	Patienter i gynækologisk behandling i forløb med medicinsk provokeret abort, hvor ydelse 3811 (1. konsultation, abort) og 3812 (2. konsultation- medicinsk abort) er gennemført.
Undersøgelse/behandling	1 til 2 døgn efter indtagelsen af det svangerskabsafbrydende medicin (mifepriston) indføres svangerskabsudstødende medicin (misoprostol) i skeden, og patienten indtager smertestillende medicin. Ultralydsscanning Støttesamtale Telefonkonsultation, 4-5 timer efter indføringen af svangerskabsudstødende medicin (misoprostol) Smertedækning Evt. anti-D (forebyggelse af Rhesusimmunisering) Journalføring
Særlige forhold	Lovbestemt udlægning Kræver ikke henvisning Ydelsen kan ikke kombineres med almene gynækologiske ydelser, der kræver henvisning. Ydelsen kan dog kombineres med ydelse 2161 (Tillæg for rekvisition af tolkebistand), 2261 (Tillæg til konsultation med tolk) og 2264 (Tillæg til konsultation med døvetolk).
Apparatur	Ultralydsapparat
Uddannelsesbehov	Undersøgelse og behandling indgår i speciallægeuddannelsen.
Klinikpersonale	Klinikpersonale kan efter delegation foretage udlevering af medicin samt vurdere og rådgive i forløbet om symptomer, effekt af behandlingen og om bivirkninger.
Uensilier	Svangerskabsudstødende medicin (misoprostol)
Kvalitetssikring	Skal følge DSOG guidelines: www.dsog.dk Indberetning til Sundhedsstyrelsens database (SEI register)
Patientinformation	Mundtlig og skriftlig information Abortvandrejournal