




Identifikation af personer i særlig risiko med henblik på vaccination mod COVID-19

Personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 betegner personer, som har en særlig høj risiko for indlæggelse og død i tilfælde af smitte med COVID-19. Disse personer har derfor et særligt behov for at blive vaccineret tidligt i vaccinationsindsatsen med de første sendinger af Comirnaty®. En læge kan ved en samlet og individuel lægefaglig risikovurdering identificere og særskilt visitere disse personer til tidlig vaccination.

Personer i særligt øget risiko adskiller sig fra andre med øget risiko ved COVID-19 ved fx at have:

- aktuel sygehuskontakt
- meget svær sygdom
- flere samtidige sygdomme
- udtalt polyfarmaci
- nedsat funktionsevne
- høj alder



Visitation af personer i særligt øget risiko

Person i særlig risiko	Identifikation	Visitation til tidlig vaccination
Personer med forløb på sygehus	Løbende ved allerede planlagte kontakter på sygehus	Behandlingsansvarlige læge
Personer uden et umiddelbart nærliggende tidspunkt for kontakt på sygehus	Løbende ved allerede planlagte kontakter i almen praksis eller speciallægepraksis	Egen læge kan sende en henvisning til sygehuset med henblik på visitation; i Region Hovedstaden og Region Sjælland til centralvisitationen og i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark til relevant sygehusafdeling

Som hovedregel skal denne særlige patientgruppe på ca. 6.000 fremfindes af de behandlingsansvarlige læger på sygehusene. Der vil dog være få fra målgruppen som ikke har et aktivt sygehusforløb, som egen læge derfor kan henvise, når de støder på dem.

Eksempler på personer i øget og i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19

Eksempel 1: Person i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 (høj sværhedsgrad af sygdom, aktuel sygehuskontakt) 67-årig med malign hæmatologisk sygdom forud for kemoterapeutisk behandlingsforløb. <i>Visitation til vaccination:</i> Denne person visiteres af behandlingsansvarlige læge på stamafdelingen til tidlig vaccination. Personen bør vaccineres uden for cytopenifase.	Eksempel 2: Person i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 (flere samtidige sygdomme, aktuel sygehuskontakt) 65-årig med overvægt (BMI > 35), dysreguleret diabetes med senfølger bl.a. i form af kronisk nyresvigt. Ambulant forløb for én eller flere af tilstandene. <i>Visitation til vaccination:</i> Denne person visiteres af behandlingsansvarlige læge på stamafdelingen til tidlig vaccination.
Eksempel 3: Person i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 (flere samtidige sygdomme, ingen aktuel sygehuskontakt) 70-årig med overvægt (BMI > 35), hjertesvigt, dysreguleret diabetes med senfølger og nedsat funktionsevne. <i>Visitation til vaccination:</i> Egen læge sender, efter lægefaglig vurdering, korrespondance med henblik på visitation til tidlig vaccination.	Eksempel 4: Person i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 65-årig med moderat KOL, som ikke har haft indlæggelseskrævende forløb og ikke har betydende komorbiditet. <i>Visitation til vaccination:</i> Denne person vurderes at have en øget, men ikke særligt øget, risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Personen skal ikke visiteres til tidlig vaccination. Personen bliver inviteret til vaccination via Digital Post og forventes at blive tilbudt vaccination i løbet af foråret 2021.