

Ydelse 0145	Samtale i et primært medicinsk behandlingssigte
Ny/eksisterende	Ny
Målgruppe/Indikation	Alle visiterede patienter mellem 4-18 år, der er udredt og som har behov for medicinsk behandling i speciallægepraksis.
Undersøgelse/ behandling	<p>Medicinsk behandling finder overvejende anvendelse i moderat til svære sygdomstilfælde og/eller hvor psykoterapeutisk/psykoedukativ behandling ikke har haft tilstrækkelig effekt eller ikke har kunnet gennemføres grundet patient/forældre/pårørendes situation.</p> <p>Speciallægen spørger ind til de aktuelle problemer og symptomer, debut af disse, og hvornår de optræder. Speciallægen planlægger sammen med patient/pårørende en <u>behandlingsplan</u> i forhold til det valgte medicinske behandlingsforløb, indhenter informeret samtykke i overensstemmelse med de til en hver tid gældende regler herom.</p> <p>Den medicinske behandling tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende vejledninger eller lignende fra Sundheds-Styrelsen.</p> <p>Af den i 2014 gældende Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser - https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=146409</p> <p>Det er særlig væsentligt, at iagttage nedenstående emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Anvendelsesområde og definitioner</i> • <i>Plan for behandling</i> • <i>Henvisning og epikriser</i> • <i>Bivirkninger, interaktioner og kontraindikationer</i> • <i>Dosering, monitorering, opfølgning m.v.</i> <p>Ved brug af antipsykotisk medicin kan fremhæves: <i>Der monitoreres inden start af behandling og efter 3 og 6 måneders behandling. Ved længerevarende behandling hver 6. måned. Speciallægen skal sikre at følgende bliver udført og registreret:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Måling af vægt og højde</i> • <i>Udregning af BMI</i> • <i>Måling af taljeomfang</i> • <i>Måling af blodtryk</i> • <i>Måling af fasteblodsukker/HbA1c og lipider</i> • <i>Optagelse af EKG</i>

	<p><i>Efter hver registrering skal speciallægen tage stilling til den fortsatte medikamentelle behandling.</i></p> <p>Ved brug af medicin til diagnosen ADHD kan fremhæves: <i>Under vedligeholdelsesbehandlingen skal speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri som minimum hvert halve år sikre, at følgende bliver vurderet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Om patienten trives i skole- eller arbejdsmæssig sammenhæng, i familien og i sine nære relationer</i> • <i>Om effekten af behandlingen er tilfredsstillende</i> • <i>Om der er bivirkninger</i> • <i>Om der er mistanke om misbrug hos patienten eller i hans/hendes miljø</i> • <i>Om højde, vækst, puls og blodtryk afviger fra normalværdierne</i> • <i>Om der er behov for fortsat medikamentel behandling</i> • <i>Om der er behov for at holde pause med den medikamentelle behandling.</i> <p><i>Efter hver registrering skal speciallægen tage stilling til den fortsatte medikamentelle behandling.</i></p> <p>Før konsultationen har speciallægen eventuelt indhentet oplysninger udsendt i standardiseret skema, som forældrene eller den unge udfylder.</p> <p>Patienten informeres både mundtligt og skriftligt, om eventuelle reaktioner/bivirkninger, og hvorledes man skal forholde sig til disse.</p> <p>I forlængelse af den medicinske samtale med barnet gennemføres, når det er relevant, samtale med primært psykoedukativt behandlingssigte med familie/pårørende. Dette er omfattet af ydelse 0145.</p>
Særlige forhold	Der udleveres skriftligt informationsmateriale om eventuelle reaktioner/bivirkninger, og hvorledes man skal forholde sig til disse.
Apparatur	Apparatur til gennemførelse af somatisk undersøgelse.
Uddannelsesbehov	
Klinikpersonale	Kvalificeret klinikpersonale kan udføre somatisk undersøgelse (Måle/veje/blodtryk), rekvirere blodprøver
Utensilier	

Kvalitetssikring	Samtalen følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, og nationale/internationale guidelines, samt BUP'S landsdækkende kliniske retningslinjer. Når nationale database findes indberettes der til denne.